

福岡和白病院 登録レジメン一覧表 (肝・胆・膵がん)

| レジメン名 | 薬剤名 | 用量 | 投与時間 | 用法 | 投与日 | インターバル |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----|-----------|--------|
| GEM±nab-PTX | ゲムシタビン (GEM) | 1000mg/m ² | 30分 | div | day1、8、15 | 28日 |
| | アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX) | 125mg/m ² | 30分 | div | day1、8、15 | |
| FOLFIRINOX | オキサリプラチン (L-OHP) | 85mg/m ² | 120分 | div | day1 | 14日 |
| | レボホリナート (I-LV) | 200mg/m ² | 120分 | div | day1 | |
| | イリノテカン (IRI) | 180mg/m ² | 90分 | div | day1 | |
| | フルオロウラシル (5-FU) | 400mg/m ² | 1~2分 | iv | day1 | |
| | フルオロウラシル (5-FU) | 2400mg/m ² | 46時間 | div | day1~2 | |
| GEM+S-1 | ゲムシタビン (GEM) | 1000mg/m ² | 30分 | div | day1、8 | 21日 |
| | テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1) | 40~60mg/回 | 1日2回 | po | day1~14 | |
| GCS | ゲムシタビン (GEM) | 1000mg/m ² | 30分 | div | day1 | 14日 |
| | シスプラチン (CDDP) | 25mg/m ² | 90分 | div | day1 | |
| | テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1) | 40~60mg/回 | 1日2回 | po | day1~7 | |
| nal-IRI+5-FU/LV | イリノテカン リポソーム製剤 (nal-IRI) | 70mg/m ² | 90分 | div | day1 | 14日 |
| | レボホリナート (I-LV) | 200mg/m ² | 120分 | div | day1 | |
| | フルオロウラシル (5-FU) | 2400mg/m ² | 46時間 | div | day1~2 | |
| GC (胆道がん) | ゲムシタビン (GEM) | 1000mg/m ² | 30分 | div | day1、8 | 21日 |
| | シスプラチン (CDDP) | 25mg/m ² | 90分 | div | day1、8 | |
| Low dose FP | フルオロウラシル (5-FU) | 250mg/body | 5時間 | 肝動注 | day1~5 | 7日 |
| | シスプラチン (CDDP) | 10mg/body | 60分 | 肝動注 | day1~5 | |
| STZ (weekly) | ストレプトゾシン (STZ) | 1000~1500mg/m ² | 30分 | div | day1 | 7日 |
| STZ (daily) | ストレプトゾシン (STZ) | 500mg/m ² | 30分 | div | day1~5 | 42日 |
| BEV+Atezo | ペバシズマブ (BEV) | 15mg/kg | 30~90分 | div | day1 | 21日 |
| | アテゾリズマブ (Atezo) | 1200mg/body | 30分 (初回60分) | div | day1 | |