

福岡和白病院 登録レジメン一覧表（肝・胆・膵がん）

レジメン名	薬剤名	用量	投与時間	用法	投与日	インターバル
GEM±nab-PTX	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	div	day1、8、15	28日
	アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX)	125mg/m ²	30分	div	day1、8、15	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン (L-OHP)	85mg/m ²	120分	div	day1	14日
	レボホリナート (I-LV)	200mg/m ²	120分	div	day1	
	イリノテカン (IRI)	180mg/m ²	90分	div	day1	
	フルオロウラシル (FU)	400mg/m ²	1~2分	iv	day1	
	フルオロウラシル (FU)	2400mg/m ²	46時間	div	day1~2	
GEM+S-1	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	div	day1、8	21日
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	40~60mg/回	1日2回	po	day1~14	
GCS	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	div	day1	14日
	シスプラチニ (CDDP)	25mg/m ²	90分	div	day1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル (S-1)	40~60mg/回	1日2回	po	day1~7	
nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカン リボソーム製剤 (nal-IRI)	70mg/m ²	90分	div	day1	14日
	レボホリナート (I-LV)	200mg/m ²	120分	div	day1	
	フルオロウラシル (FU)	2400mg/m ²	46時間	div	day1~2	
GC (胆道がん)	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	div	day1、8	21日
	シスプラチニ (CDDP)	25mg/m ²	90分	div	day1、8	
Low dose FP	フルオロウラシル (FU)	250mg/body	5時間	肝動注	day1~5	7日
	シスプラチニ (CDDP)	10mg/body	60分	肝動注	day1~5	
STZ (weekly)	ストレプトゾシン (STZ)	1000~1500mg/m ²	30分	div	day1	7日
STZ (daily)	ストレプトゾシン (STZ)	500mg/m ²	30分	div	day1~5	42日
BEV+Atezo	ベバシズマブ (BEV)	15mg/kg	30~90分	div	day1	21日
	アテゾリズマブ (Atezo)	1200mg/body	30分 (初回60分)	div	day1	
GC+DUR	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	30分	div	day1、8	21日
	シスプラチニ (CDDP)	25mg/m ²	90分	div	day1、8	
	デュルバルマブ (DUR)	1500mg/body	60分	div	day1	
DUR (維持療法)	デュルバルマブ (DUR)	1500mg/body	60分	div	day1	28日
DUR+TRE	デュルバルマブ (DUR)	1500mg/body	60分	div	day1	28日
	トレメリムマブ (TRE)	300mg/body	60分	div	day1	