

福岡和白病院 登録レジメナー覧表（食道がん）

レジメン名	薬剤名	用量	投与時間	用法	投与日	インターバル
高用量FP+RT	フルオロウラシル（FU）	700mg/m ² /day	96時間	civ	day1～4	28日
	シスプラチン（CDDP）	70mg/m ²	120分	div	day1	
高用量FP	フルオロウラシル（FU）	800mg/m ² /day	120時間	civ	day1～5	28日
	シスプラチン（CDDP）	80mg/m ²	120分	div	day1	
高用量FP+Pemb	ペムブロリズマブ（Pemb）	200mg/body	30分	div	day1	21日
	フルオロウラシル（FU）	800mg/m ² /day	120時間	civ	day1～5	
	シスプラチン（CDDP）	80mg/m ²	120分	div	day1	
Pemb（6週）	ペムブロリズマブ（Pemb）	400mg/body	30分	div	day1	42日
DCF（bi-weekly）	ドセタキセル（DTX）	30mg/m ²	60分	div	day1、15	28日
	フルオロウラシル（FU）	800mg/m ² /day	120時間	civ	day1～5	
	シスプラチン（CDDP）	80mg/m ²	120分	div	day1	
DTX	ドセタキセル（DTX）	70mg/m ²	60分	div	day1	21日
weekly PTX	パクリタキセル（PTX）	100mg/m ²	60分	div	day1、8、15、22、29、36	49日
Nivo（2週）	ニボルマブ（Nivo）	240mg/body	30分	div	day1	14日
Nivo（4週）	ニボルマブ（Nivo）	480mg/body	30分	div	day1	28日
NDP+5-FU	ネダプラチン（NDP）	90mg/m ²	120分	div	day1	28日
	フルオロウラシル（FU）	800mg/m ² /day	120時間	civ	day1～5	