

福岡和白病院 登録レジメ一覧表（白血病・MDS）

レジメン名	薬剤名	用量	投与時間	用法	投与日	インターバル
CAG	アクリルピシン（ACR）	14mg/m ²	1～5分	iv	day1～4	21～28日
	シタラビン（Ara-C）	10mg/m ² /回	12時間毎	sc	day1～14	
	フィルグラスチム	150 μg/body	-	sc	day1～14	
AZA（皮下注）	アザンチジン（AZA）	75mg/m ²	-	sc	day1～7	28日
AZA（静注）	アザンチジン（AZA）	75mg/m ²	10分	div	day1～7	28日
AZA+ベネトクラクス	アザンチジン（AZA）	75mg/m ²	-	sc	day1～7	28日
	ベネトクラクス	100mg/body（初日）	1日1回	po	day1～28	
		200mg/body（2日目）				
		400mg/body				
FCR	リツキシマブ（Rmab）	375mg/m ²	添付文書参照	div	day1	28日
	フルダラビン（FLU）	25mg/m ²	30分	div	day2～4	
	シクロホスファミド（CPA）	250mg/m ²	30分	div	day2～4	
モガムリズマブ	モガムリズマブ	1mg/kg	120分	div	day1	7日
ビキセオス（寛解導入療法）	ビキセオス	100U/m ²	90分	div	day1、3、5	14～35日
ビキセオス（地固め療法）	ビキセオス	65U/m ²	90分	div	day1、3	35～56日